

★ Преимущества:

- Минимальное влияние на защищаемую культуру
- Высокая эффективность против широкого спектра злаковых сорняков
- В 1,5 раза больше площадь обработки одной канистрой
- Привычная стоимость 1 га
- 100% контроль однолетних злаковых сорняков
- Универсальность применения на многих культурах

Высококонцентрированный системный гербицид для контроля широкого спектра злаковых сорняков в посевах двудольных сельскохозяйственных культур

★ Механизм действия:

Благодаря системным свойствам препарат проникает через надземные части растения в течение 1-3 часов после внесения и накапливается в точках роста, где ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях злаковых сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран. Отмирание точек роста приводит к прекращению роста и гибели злаковых сорняков.

★ Препаративная форма:

ЭМВ – эмульсия масляно-водная, содержащая 110 г/л феноксапроп-П-этила

★ Спектр активности:

- Просо куриное
- Просо волосовидное
- Щетинник (мышей), виды
- Овсяг
- Метлица обыкновенная
- Лисохвост полевой
- Мятлик однолетний
- Росичка кроваво-красная
- и другие
- *Echinochloa crus-galli*
- *Panicum capillare*
- *Setaria* spp.
- *Avena fatua*
- *Apera spica-venti*
- *Alopecurus myosuroides*
- *Poa annua*
- *Digitaria sanguinalis*

★ **Регламенты применения
Фуроре® Ультра:**

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения
свекла сахарная свекла кормовая, свекла столовая (кроме пучкового товара), морковь (кроме пучкового товара), соя, рапс, подсолнечник, капуста белокочанная средне- и позднеспелых сортов, горох (кроме зеленого горошка)	0,5-0,75 л/га	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га

Упаковка: 5 литров



Bayer CropScience

Московский офис
 121069, г. Москва, а/я 6
 Тел.: (495) 956-13-20
 Факс: (495) 956-13-18

www.bayercropscience.ru

Барнаул	Тел./факс: (3852) 49-68-06
Белгород	Тел./факс: (4722) 36-26-86
Воронеж	Тел./факс: (4732) 46-86-07
Казань	Тел./факс: (8432) 92-08-67
Краснодар	Тел./факс: (861) 279-01-42
Красноярск	Тел./факс: (3912) 27-15-98
Липецк	Тел./факс: (4742) 70-34-80
Нижний Новгород	Тел./факс: (831) 278-97-23
Новосибирск	Тел./факс: (383) 348-58-18
Омск	Тел./факс: (3812) 77-56-04
Оренбург	Тел.: (3532) 77-57-50
Ростов-на-Дону	Тел./факс: (863) 200-25-01
Рязань	Моб. тел.: (916) 100-73-93
Самара	Моб. тел.: (927) 733-83-21
Саранск	Тел./факс: (83437) 2-10-15
Смоленск	Тел./факс: (4812) 55-73-66
Ставрополь	Тел./факс: (863) 235-08-05
Тюмень	Тел./факс: (3452) 75-44-74
Уфа	Моб. тел.: (917) 406-50-61

**Новый Фуроре
на Вашем поле**



ультра
Фуроре®



Минимальное
влияние на
защищаемую
культуру



Bayer CropScience