

Свобода творчества на поле



Секатор®

ТУРБО



ODESI
fluid power

Мощнее
Увереннее
Надежнее



Science For A Better Life

Действующие вещества и концентрации

Йодосульфурон	25 г/л
Амидосульфурон	100 г/л
Мефенпир-диэтил (антидот)	250 г/л

Препаративная форма

Масляная дисперсия - ODesi® от английской аббревиатуры **OD** – 'Oil Dispersion' (МД)

Дозы применения

50 - 100 мл/га

Культуры:

- Пшеница озимая
- Пшеница Яровая
- Ячмень озимый
- Ячмень яровой
- Лён долгунец
- Кукуруза

Преимущества:

- 1. Инновационная формуляция ODesi® обеспечивает большую надёжность против:**
 - трудноискоренимых сорных растений;
 - переросших сорных растений;
 - сорных растений, обработанных в сложных погодных условиях.
- 2. Наличие антидота:**
 - селективность к культуре;
 - широкий временной и температурный диапазон сроков применения.
- 3. Две современные сульфонилмочевины с невысокой нормой расхода:**
 - широкий спектр действия;
 - эффективность против трудноокореняемых сорных растений (подмаренник, осоты).
- 4. Регистрация для авиаобработок.**

Позиционирование:

- Широкий спектр двудольных сорняков, наличие подмаренника, баковые смеси с Пума Супер, опрыскивание в фазу трубкования культуры, селективность к культуре



fluid power

- ◆ **Меньше стекание рабочего раствора с поверхности растений**
- ◆ **Лучшее смачивание поверхности листа**
- ◆ **Больше действующих веществ поступает в растения**

Для более эффективного и надёжного контроля сорняков



Влияние формуляции на эффективность гербицидного действия

Секатор
ТУРБО

Благодаря инновационной формуляции ODesi®, обеспечивающей поступление большего количества действующих веществ в сорные растения, выше эффективность против:


- ♦ трудноконтролируемых сорных растений (вьюнок, марь белая, бодяк)
- ♦ переросших сорных растений
- ♦ сорных растений обрабатываемых в трудных погодных условиях



Сроки и нормы применения

Секатор
ТУРБО

Широкие сроки применения обеспечиваются за счёт наличия в препаративной форме МЕФЕНПИРА, гарантирующего высокую селективность к обрабатываемой культуре



Надёжный контроль над основными экономически значимыми двудольными сорняками

Секатор
ТУРБО

Амброзия, виды (*Ambrosia* spp.)
Щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*)
Очный цвет полевой (*Anagallis arvensis*)
Пупавка, виды (*Anthemis* spp.)
Лебеда, виды (*Atriplex* spp.)
Пастушья сумка (*Capsella bursa pastoris*)
Марь, виды (*Chenopodium* spp.)
Бодяк полевой (*Cirsium arvense*)*
Вьюнок (*Convolvulus arvensis*)
Descurainia sophia
Пикульник (*Galeopsis* spp.)
Галинсога мелкоцветная (*Galinsoga ciliata*)
Подмаренник цепкий (*Galium aparine*)
Подсолнечник сорный (*Helianthus annuus*)
Яснотка стеблеобъемлющая (*Lamium amplexicaule*)
Ромашка, виды (*Matricaria* spp.)

Незабудка полевая (*Myosotis arvensis*)
Мак самосейка (*Papaver rhoeas* (2 - 4 листа)
Горец, виды (*Polygonum* spp.) (2 - 4 листа)
Люттик полевой (*Ranunculus arvensis*)
Редька дикая (*Raphanus raphanistrum*)
Щавель, виды (*Rumex* spp.)
Горчица полевая (*Sinapis arvense*)
Осо́т полевой (*Sonchus arvensis*)
Звездчатка средняя (*Stellaria media*)
Ярутка полевая (*Thlaspi arvensis*)
Фиалка, виды (*Viola* spp.) (2 - 4 листа)
Рапс (падалица)
Марь, виды (*Chenopodium* spp.)

100 мл / га


Щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*)
Очный цвет полевой (*Anagallis arvensis*)
Пупавка, виды (*Anthemis* spp.)
Лебеда, виды (*Atriplex* spp.)
Пастушья сумка (*Capsella bursa pastoris*)

Пикульник (*Galeopsis* spp.)
Подмаренник цепкий (*Galium aparine*)
Подсолнечник сорный (*Helianthus annuus*)
Яснотка стеблеобъемлющая (*Lamium amplexicaule*)
Ромашка, виды (*Matricaria* spp.)
Незабудка полевая (*Myosotis arvensis*)
Горец, виды (*Polygonum*, spp.)
Щавель, виды (*Rumex* spp.)
Горчица полевая (*Sinapis arvense*)
Звездчатка средняя (*Stellaria media*)
Ярутка полевая (*Thlaspi arvensis*)
Рапс (падалица)

75 мл / га

Большая надёжность против:

- ♦ трудноконтролируемых сорных растений
- ♦ переросших сорных растений
- ♦ сорных растений, обрабатываемых в трудных условиях



Инновационная
формуляция (ODesi®)



- ♦ Селективность к культуре
- ♦ Широкий временной и температурный диапазон сроков применения



Наличие антидота

- ♦ Широкий спектр действия
- ♦ Эффективность против трудноконтролируемых сорных растений (подмаренник, осоты)




Две современные сульфонилмочевины с невысокой нормой расхода

Наличие регистрации для авиаобработки



Агритокс + Секатор Турбо - на зерновых

Баковая смесь




Когда баковая смесь:

1. Если широкий спектр сорняков;
2. Если нужно снизить дозировки гербицидов.



Когда


- «Слабый фон» засорения;
- Оптимальная фаза развития сорняков.



Когда

- «Жёсткий фон» засорения;
- Переросшие сорняки.

Раздельное применение




0,7 - 1,5 л/га

- Вьюнок
- Василёк
- Марь
- Осот розовый (бодяк)

Особенности

Ограниченный спектр видов сорняков



Многолетние сорняки
0,1 л/га

- Осоты жёлтый
- Осот розовый (бодяк)
- Латук

Особенности

«Слабая работа» по вьюнку, васильку

Однолетние сорняки
0,05-0,1 л/га
(чем больше фаза сорняка – тем больше дозировка)

- Подмаренник
- Ромашка
- Мак
- Горчица (виды)
- Гречишка татарская
- Дескурация
- Пастушья сумка
- Сурепка
- Ярутка
- Подсолнечник (падалица, сорта)
- Рапс (падалица, сорта)

Осеннее применение



Секатор®
ТУРБО



ODESi
fluid power


Мощнее
Увереннее
Надежнее



Science For A Better Life

Оптимизация сроков применения

Секатор
ТУРБО



Секатор Турбо – преимущества при осеннем применении

Секатор
ТУРБО

Почему при осеннем применении лучше использовать именно Секатор Турбо?

- В отличие от большинства других противодвудольных гербицидов сохраняет свою эффективность при пониженных температурах (от +5)
- В отличие от ВСЕХ остальных противодвудольных гербицидов содержит антидот, позволяющий снизить риски фитотоксичности, что особенно важно на ранних, наиболее чувствительных стадиях развития культуры;
- Широкий спектр подавляемых сорняков, всходящих в осенний период, в том числе эффективный контроль падалицы подсолнечника, рапса



Осеннее применение Секатора Турбо рекомендуется при сочетании следующих факторов:

- 1) Нормальное развитие культуры (от 3-х листьев до фазы кущения);
- 2) Температура воздуха не ниже +5 градусов Цельсия;
- 3) Засоренность выше уровня ЭПВ следующими зимующими сорняками:

- *Незабудка полевая (Myosotis arvensis)*
- *Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris)*
- *Подмаренник цепкий (Galium aparine)*
- *Пунавка, виды (Anthemis ssp.)*
- *Ромашка, виды (Matricaria ssp.)*
- *Фиалка, виды (Viola ssp.)*
- *Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule)*
- *Звездчатка средняя (Stellaria media)*
- *Мак самосейка (Papaver rhoeas)*



Секатор Турбо – осеннее применение

Секатор
ТУРБО

Осеннее применение **Секатора Турбо**, рекомендуемое в случае наличия засорения двудольными в этот период, дает следующие преимущества:

- ♦ способствует лучшему развитию растений на ранних этапах и непосредственно защищает важный элемент урожая – количество продуктивных стеблей;
- ♦ максимально эффективный контроль сорняков, находящихся на ранней, самой чувствительной стадии развития;
- ♦ сохраняет внесенные с осени удобрения для культуры;
- ♦ снижает риски перезимовки;
- ♦ снижает риски последствия на последующие культуры в севообороте.



Свобода творчества на поле



Секатор®

ТУРБО



ODESI
fluid power

Мощнее
Увереннее
Надежнее



Science For A Better Life