

### О препарате



- Высококонцентрированный системный гербицид
- Для контроля широкого спектра однолетних злаковых сорняков
- Разрешен к применению на многих культурах
  - Свёкла все виды
    - Рапс
    - **©** Соя
    - Сорох
    - О Морковь

    - Подсолнечник



# О препарате




Информация о препарате				
Препаративная форм	ла ЭМВ			
Эмульсия масляно-водная				
Действующие вещества				
феноксапроп-П-этил	110 г/л			
Норма расхода				
(по д.в.: 55 - 83 г/га) $\Big\}$ 0,5 — 0,75 л/га				
Культура	свёкла, соя, рапс, горох, подсолнечник, капуста и др.			
Упаковка	5 л			



#### Механизм действия



- Системные свойства Фуроре Ультра обеспечивают проникновение через надземные части сорняков
- За 1 3 часа после внесения препарат накапливается в точках роста.
- Происходит ингибирование биосинтеза жирных кислот в меристемных тканях злакового растения
- Клеточные мембраны не образуются
- В результате точка роста отмирает
- Прекращается рост растения
- Злаковый сорняк погибает



#### Основные преимущества




- Минимальное влияние на защищаемую культуру
- 100% контроль однолетних злаковых сорняков
- Универсальность применения на многих культурах



#### Спектр активности



- Овсюг
- Лисохвост полевой
- Мятлик однолетний
- Щетинник (мышей), виды
- Просо куриное
- Просо волосовидное
- Метлица обыкновенная
- Росичка кроваво-красная
- И другие



## Регламенты применения



Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения
свекла сахарная			
свекла кормовая, свекла столовая (кроме пучкового товара),			
морковь (кроме пучкового товара),		Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам,
соя, рапс,	0,5-0,75 л/га	сорняки (овсюг, виды щетинника,	начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры).
подсолнечник, капуста белокочанная средне- и позднеспелых сортов,		просо куриное)	Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га
горох (кроме зеленого горошка)			



