



**Пантера®**

**Надежная защита  
вашего поля**



# Характеристика препарата

Пантера®

---

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Действующее вещество:    | Квизалофоп-П-тефурил     |
| Формуляция:              | КЭ (концентрат эмульсии) |
| Содержание д.в.:         | 40 г/л                   |
| Норма расхода препарата: | 0,75 – 1,5 л/га          |

---

## Оптимизированная система смачивания и прилипания обеспечивает:

- ♦ получение качественного рабочего раствора
- ♦ распределение препарата на поверхности растения
- ♦ проникновение препарата в кутикулу и листовую поверхность



# Широкий спектр действия Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Пантера®

**Пырей (*Agropyron repens*)**  
**Свиной (Cynodon dactylon)**  
**Гумай (*Sorgum halepense*)**  
**Элеузина (*Eleusine indica*)**  
**Лисохвост (*Alopecurus myosuroides*)**  
**Просо (*Panicum*)**  
**Мятлики (*Poa* sp.)**  
**Пеннисетум (*Pennisetum* sp.)**  
**Овсяг (*Avena fatua*)**  
**Ежовник (*Echinochloa crusgalli*)**  
**Щетинники (*Setaria* spp.)**  
**Плевел (*Lolium temulentum*)**  
**Полевица (*Agrostis tenius*)**  
**Кострец (*Bromus sterilis*)**  
**Ценхус (*Cenchrus equinatas*)**  
**Полевичка (*Eragrostis minor*)**



# Регистрация в России

Пантера®

| Культура                                                                                                                                              | Вредный объект                                                | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения.                                                   | Срок ожидания (кратность обработок) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Свекла сахарная, столовая, кормовая, <b>картофель</b> , морковь, лук, лен, соя, капуста белокочанная, томаты рассадные и посевные, подсолнечник, рапс | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) | 0,75-1,0                      | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков, независимо от фазы развития культуры. | - (1)                               |
|                                                                                                                                                       | Многолетние злаковые (пырей ползучий)                         | 1,0-1,5                       | Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15см, независимо от фазы развития культуры. |                                     |


# Механизм действия

Пантера®

Пантера перемещается по проводящей системе растения, скорость передвижения зависит от активности растения.

«Закрытая» структура молекулы обеспечивает уменьшение молекулярного распада в период низкой активности растения (неблагоприятные условия).

Результат: Пантера продолжает действовать при возвращении к нормальным условиям






# Механизм действия

Пантера®

Быстро поглощается сорняками. Достаточно 1 часа для поглощения Пантеры сорным растением в количестве, необходимой для его гибели. Препарат начинает действовать сразу после проникновения



Пантера быстро проникает во все части растения, после чего начинает угнетать рост корневищ, точек роста и листьев. При нормальных погодных условиях достаточно 3-7 дней для полного проникновения в корневую систему, чтобы предотвратить повторное отрастание.

# Основные преимущества

Пантера®

- ✓ Высокая селективность и безопасность для культурных растений даже при случайной передозировке
- ✓ Системное действие позволяет Пантере проникать и уничтожать корневища сорняков
- ✓ Быстрый полураспад действующего вещества препарата в почве (6 часов)
- ✓ Современная, готовая к использованию препаративная форма без неприятного запаха
- ✓ Низкая токсичность для человека (3 класс опасности) и пчел (3 малоопасный)
- ✓ Возможность использования в баковых смесях.

