

# Байцидал® ВП 25

Нет личинок – нет мух

- Обладает ларвицидным и овицидным действием (приводит к гибели эмбрионов мух и вылупившихся из яиц личинок)
- Предотвращает появление взрослых особей
- Стойкий, работает на сложных объектах (все виды подстилок, решетчатый пол, навозные ямы и желоба, мусор)
- Быстро растворим, приготовление раствора занимает 3–5 минут
- Отлично дополняется адальтицидами Квик Байт® ВГ 10 и Сольфак® 5% м.э.



Часть программы

**БАЙОБЕЗОПАСНОСТЬ**



Science For A Better Life

## Приготовление рабочего раствора и применение.

Рабочий раствор применяется для обработки горизонтальных поверхностей в местах расплода насекомых. Из расчета 2 г препарата Байцидал® ВП 25 на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой площади.

Оборудование	Кол-во препарата, г	Кол-во воды, л	Площадь обрабатываемой поверхности, м <sup>2</sup>
Лейка	20	10	10
Ранцевый опрыскиватель ОМР-2, ОЭС, КДУ	200	8–10	100
Сельскохозяйственные установки на автомашине и тракторах	2000	200–300	1000

### Приготовление рабочего раствора:

Для обработки поверхностей, где происходит размножение личинок, 20 г препарата Байцидал® ВП 25 растворяют в 10 л воды комнатной температуры, и наносят на 10 м<sup>2</sup> загрязненной поверхности.

### Для обработки навозных резервуаров

8 г препарата Байцидал® ВП 25 растворяют в 1 л воды и распыляют на объем в 1000 л навозной жижи. При обработке навозных ям содержимое перемешивать не нужно.

### Применение:

Обработке подлежат места расплода насекомых (горизонтальные поверхности): навозные желоба, навозные ямы, полы (решетчатые и с подстилкой), места вокруг опорных конструкций, под кормушками и поилками.

Обработки проводят методом опрыскивания. Рабочее давление поддерживают на уровне 2-3 бар.

Опрыскивание проводят с помощью механического или автоматического оборудования, в зависимости от объема

работ используют наиболее подходящее оборудование – опрыскиватели типа ОМР-2, ОЭС, КДУ, а также сельскохозяйственные установки на автомашинах и тракторах.

При обработке ранцевым опрыскивателем используйте плоскоструйные распылительные форсунки с факелом распыла «полый конус» с расходом до 3 л/мин.

Обработку начинают при появлении первых насекомых и перед вводом животных и птицы в помещение (конец санитарного разрыва). Повторяют каждые 2–3 недели при необходимости.

После уменьшения численности личинок дозу препарата можно снизить в два раза.

**При смешивании учитывайте объемный вес препарата Байцидал® ВП 25: 100 г соответствуют 400 мл.**

Байцидал® ВП 25 содержит в качестве действующего вещества трифлумурон 25%. Выпускается в форме водосмачиваемого порошка, расфасованного в картонные коробки по 1 кг.



Science For A Better Life

107113, Москва,  
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2  
Телефон: +7 (495) 234-20-55;  
+7 (495) 234-20-65  
ru-animal-health@bayer.com  
www.bayeranimalhealth.ru