



Стабилан®


Защити посевы
от полегания



Science For A Better Life

Факторы, вызывающие полегание и его последствие

Стабилан®



Описание препарата

Стабилан®

Класс препарата: Регулятор роста (ретардант)

Действующее вещество: Хлормекват хлорид

Препаративная форма: Водный раствор

Концентрация д.в.: 460г/л

Способ действия : Системный

Культура : Озимая и яровая пшеница,
яровой ячмень и озимая рожь

Упаковка: 20-ти литровые канистры



Действующее вещество проникает в растение в основном через листья, а также через корни ингибируя биосинтез гибберелловой кислоты и повышая уровень цитокининов, тем самым :

- ♦ Увеличивает количество корней , что обеспечивает лучшее укоренение растений (особенно важно в сухих условиях) и способствует более сильному и сбалансированному поступлению питательных веществ и воды
- ♦ Способствует лучшему кущению зерновых культур
- ♦ Повышает устойчивость растений к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям
- ♦ Уменьшает рост растений в высоту - укорачивает междоузлия
- ♦ Увеличивает диаметр стебля- вызывает утолщение соломины
- ♦ Увеличивает содержание хлорофилла

Вследствие этого растения:

- ♦ Становятся устойчивыми к полеганию
- ♦ Снижается риск проникновения возбудителей гнилей в корневую шейку растения

Кроме того, использование Стабилана® способствует равномерности цветения и созревания зерна.



Эффект от применения

Стабилан®




Стабилан® применен




Стабилан® не применен

Проведенные исследования показали, что применение Стабилана® позволило снизить риск возникновения полегания в 6 раз*.



Источник: Nufarm LAT 1998




**Применение
Стабилана®
позволило
сохранить от 10 до
22% урожайности
культуры***



*- Nufarm LAT 1998

Применение на озимой пшенице

Стабилан®



1

Максимальное
количество
обработок

200 - 300
л/га



2 часа
перед



Погода без дождя и ветра



4 часа
после



-(3) дня
после




60 дней до
урожая



При работе в соответствии с
регламентом - токсичности не
наблюдалось.

Применение на яровой пшенице

Стабилан®



1

Максимальное
количество
обработок

200 - 300
л/га



2 часа
перед



Погода без дождя и ветра



4 часа
после



-(3) дня
после




60 дней до
урожая



При работе в соответствии с
регламентом - токсичности не
наблюдалось.

Применение на ячмене

Стабилан®



1

Максимальное
количество
обработок

200 - 300
л/га



2 часа
перед



Погода без дождя и ветра



4 часа
после



-(3) дня
после




60 дней до
урожая



При работе в соответствии с
регламентом - токсичности не
наблюдалось.

Применение на ржи

Стабилан®



1

Максимальное
количество
обработок

200 - 300
л/га



2 часа
перед



Погода без дождя и ветра



4 часа
после



-(3) дня
после



60 дней
до урожая



При работе в соответствии с
регламентом - токсичности не
наблюдалось.

Культура	Норма расхода препарата (л/га)	Норма расхода рабочей жидкости (л/га)	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания, (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
Пшеница озимая и яровая	1.5-2.0	200-300	Опрыскивание растений в начале фазы кущения до начала фазы выхода в трубку.	- (1)	- (3)
Ячмень яровой	1.5				
Рожь озимая	2-3		Опрыскивание растений в фазе выхода в трубку.		



- ♦ *Повышает устойчивость растений к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям*
- ♦ *Существенно снижается риск полегания*
- ♦ *Возможно применение более высоких норм азотных удобрений*
- ♦ *Достигается увеличение урожайности*
- ♦ *Упрощает и ускоряет уборку, сокращает издержки на дополнительную сушку зерна*





Стабилан®

Защити посе́вы
от полегания



Science For A Better Life