


Комбинированный мезостемно-системный фунгицид с четко выраженным лечебным эффектом для защиты сахарной свеклы от церкоспороза, фомоза, рамуляриоза и других заболеваний.



Структурная формула Трифлуксистробина

Механизм действия

Трифлуксистробин нарушает процесс дыхания в митохондриях клеток, блокируя транспортирование электронов, и создает защитный экран, который предотвращает проникновение патогена вглубь растения, стойкий к смыванию дождем. Активный против грибов рода Ascomycetes, Deuteromycetes, Basidiomycetes, Oomycetes. Эффективность трифлуксистробина состоит в контроле болезней на ранних стадиях развития гриба (прорастание спор, рост мицелия, формирование апресорий) - профилактическое действие.

Действие ципроконазола заключается в ингибировании диметилазы, фермента, который отвечает за биосинтез стеролов (строительный материал клеток патогена), что поднимает целостность клеточных стенок грибов и ведет к их гибели, а также ограничению распространения болезни - лечебный эффект. Кроме этого, ципроконазол имеет отличные системные свойства и двигается акропетально.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Норма расхода л/га	Срок ожидания (кратность)
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезни, последующее – через 21 день или при появлении новых симптомов одной из болезней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га.	0,3	21(2)
Свекла столовая				7(2)



Горячая линия Bayer
8 (800) 234-20-15 (для аграриев)

www.cropscience.bayer.ru



- Прайс-лист
- Каталог препаратов
- Атлас вредных объектов
- Прогноз погоды
- Калькулятор форсунок
- Меры безопасности


Свекла оценит
вашу заботу



СФЕРА® МАКС


FiTonics® Technology

СФЕРА® МАКС



Больше сахаристость, урожайность

Оптимального фунгицидного эффекта можно достичь только при условии соблюдения рекомендаций по применению продукта.



Эффективность против Мучнистой росы и Церкоспороза, при минимальной норме расхода Сфера® Макс 0,3 л/га, до появления видимых признаков поражения.

Сроки применения против мучнистой росы и церкоспороза, фомоза, рамуляриоза, ржавчины. Вторая обработка через 18-21 день после первой, в период эпифитотии.

Преимущества

- Новая комбинация действующих веществ.
- Широкий спектр биологической активности.
- Выраженный лечебный и физиологический (озеленяющий) эффект.
- Отсутствие риска появления резистентности благодаря двойному механизму действия.
- Высокая селективность - фунгицид Сфера® Макс в рекомендованных нормах расхода хорошо воспринимается сахарной свеклой.

Здоровые листья – хороший урожай!

- Следует максимально сохранить вегетативную массу (июль - август).
- Создать необходимые условия в период критического влагообеспеченности.
- Продолжить жизнедеятельность старых листьев (дополнительная ассимиляция ФАР).
- Защитить от болезней - уменьшить потери сахара на формирование молодых листьев.
- Оптимального фунгицидного эффекта можно достичь только при условии соблюдения рекомендаций по применению продукта.

Период защитного действия

Биологический эффект продолжается в течении 2-4 недель, в зависимости от погодных условий и степени инфицированности.

Скорость воздействия

Через несколько часов после обработки.

Фитотоксичность

Проведенные испытания не выявили фитотоксических эффектов.



Совместимость с другими препаратами

Сфера макс совместима с большинством регуляторов роста, жидкими удобрениями, инсектицидами, другими контактными и системными фунгицидами. Перед приготовлением рабочего раствора рекомендуется проверка на химическую совместимость.

Препаративная форма

- Концентрат суспензии
- трифлуксистробина - 375 г/л
 - ципроконазола - 160 г/л.

Высокоэффективная формуляция для контроля всех основных заболеваний сахарной свеклы.




Церкоспороз



Мучнистая роса



Рамуляриоз



Фомоз



Ржавчина