Влияние на урожайность

Осень:
Регулятор роста
Фомоз (Phoma lingam)

Весна:
Регулятор роста
Фомоз (Phoma lingam)

Цветение:
Sclerotinia – склеротиниоз
Alternaria – альтернариоз



Фазы развития ▶	0	10	12	14	19	30	50	57-59	65	77
Фоликур®	○	○	0,5 л/га		○	○	○	○	○	○
Фоликур®	○	○	○	○	○	0,75 л/га		○	○	○
Фоликур®	○	○	○	○	○	○	○	0,75-1,0 л/га		○

Осеннее применение
- Более низкорослые и тёмные растения
- Выше масса корней
- Контроль заболеваний

Повышенная устойчивость к перезимовке и большая плотность растений весной

Весеннее применение
- Более низкорослые растения
- Снижение полегания
- Выше фотоассимиляция
- Улучшенное накопление питательных веществ в стручках и семенах

Выше урожай

Повышение урожайности, Германия (2000)



Регламент применения

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата, л/га	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, жёлтая	0,5	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40 (1–2)
	Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса	1,0	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, мучнистая роса, сетчатая, тёмно-бурая и полосатая пятнистости		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40 (1)
Рожь озимая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, ринхоспориоз, фузариоз колоса		Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40 (1-2)
Овёс	Ржавчина корончатая, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40 (1)
Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз		Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее — с интервалом 14–16 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40 (2)

Горячая линия Bayer
8 (800) 234-20-15 (для аграриев)

www.cropscience.bayer.ru

- Прайс-лист
- Каталог препаратов
- Атлас вредных объектов
- Прогноз погоды
- Калькулятор форсунок
- Меры безопасности

На защите рапса и колоса

Фоликур®

Фоликур®

Высокоэффективный системный фунгицид для защиты зерновых и рапса. Обладает как профилактическим, так и лечебным действием. Благодаря своим росторегулирующим свойствам при осеннем применении на озимом рапсе, обеспечивает лучшую перезимовку культуры

Преимущества:

- **Широкий спектр действия**
  включает основные заболевания как вегетативных так и генеративных органов зерновых культур
- **Исключительно высокая активность против ржавчины и фузариоза колоса**
  гарантированное снижение содержания микотоксинов в зерне
- **Гибкость в применении**
  обладает защитным, лечебным и искореняющим действием
- **Росторегулирующее действие (при применении на рапсе)**
  лучшая перезимовка при осеннем применении

Эффективность применения Фоликура®

Мелкоделяночные опыты, Сибирь, 2008

ОБРАБОТАНО **ФОЛИКУРОМ®**

КОНТРОЛЬ (БЕЗ ОБРАБОТКИ)

Двукратная обработка Фоликуром® (2 х 1 л/га)

Защита зерновых

Фоликур® – надёжный препарат для защиты зерновых от болезней колоса.

Негативное влияние фузариозной инфекции

- **Потери урожая**
  - образование легковесного щуплого зерна
- **Снижение всхожести семян**
- **Накопление микотоксинов в зерне**
  - возможные проблемы с реализацией урожая

Фоликур® не только проявляет активность против возбудителя фузариоза, но и обеспечивает снижение содержания токсинов в зерне, а также обладает активностью против ряда других заболеваний колоса

Фоликур® важный элемент комплексного подхода к защите посевов от фузариоза

Обработка посевов Фоликуром® должна рассматриваться как элемент комплексного подхода для защиты от фузариоза, также включающего и другие мероприятия

- **Выбор расположения поля**
- **Севооборот**
- **Выбор сорта**
- **Подготовка почвы**
- **Срок посева**
- **Внесение удобрений**
- **Применение регуляторов роста**
- **Срок уборки**

Для защиты от фузариоза колоса наиболее эффективны обработки в фазу начала цветения.
Для получения максимального срока защитного действия от заболеваний вегетативных органов рекомендуется проведение профилактических обработок (с учетом погодных условий и сообщений пунктов сигнализации и прогнозов о развитии заболевания) или обработок при минимальной степени поражения

Во избежания солнечных ожогов рекомендуется в условиях жаркой солнечной дневной погоды проводить обработку в вечернее время

Характеристика препарата

Препаративная форма:	концентрат эмульсии
Химический класс:	триазолы
Действующее вещество:	тебуконазол 250 г/л
Упаковка:	канистра 5 л
Механизм действия:	ингибирование биосинтеза эргостерола

Фоликур® - стандарт для выращивания озимого рапса во всех европейских странах, благодаря выраженному росторегулирующему эффекту.

При обработке озимого рапса в осенний период (3-5 листков) нарастание вегетативной массы приостанавливается, в тоже время продолжается фотосинтез. Это способствует накоплению пластических веществ в корнях и развитию мощной корневой системы.

Весеннее применение фунгицида Фоликур® обеспечивает стойкость растений к полеганию.

Фоликур® оказывает как профилактическое, так и лечебное действие, сохраняя свою эффективность на протяжении нескольких недель.