



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2880 от « 17 » ноября 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

Байер КропСайенс АГ (Германия)

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Деларо, КС (175 г/л протиоконазола + 150 г/л
трифлуксистробина)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 019-02-2880-1

на срок по « 16 » ноября 2030 г. и допускается к обороту на
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

(подпись)



№003264



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,5-1,0	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса,	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30(1-2)
0,5-1,0 (А)		мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 50-100 л/га	30(1)
0,5-1,0	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость,	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	30(1-2)
0,5-1,0 (А)		ржавчина карликовая, ринхоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 50-100 л/га	30(1)
0,5-1,0	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	30(1-2)
	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость		
0,5-1,0	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание растений в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	20(1-2)
0,5-1,0 (А)			Опрыскивание в период вегетации. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом. Расход рабочей жидкости – 50-100 л/га	20(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Деларо, КС (175 г/л протиоконазола + 150 г/л трифлуксистробина) от 17 ноября 2020 г. № 2880

1	2	3	4	5
0,75-1,0	Свекла сахарная и столовая	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезни, последующее – через 21 день или при появлении новых симптомов одной из болезни. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(2)
0,5-1,0	Соя	Церкоспороз, септориоз, антракноз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы цветения. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	28(2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



